

# ОБЕРЕЖНО КІР



## ІНКУБАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

У СЕРЕДНЬОМУ  
8 - 12 ДНІВ /ТРИВАЄ 14 ДНІВ



## ПЕРЕДАЧА ІНФЕКЦІЇ

ВІД 1 ДО 2 ДНІВ  
ДО НАСТАННЯ ВИСИПУ  
ТА ДО 4 ДНІ ПІСЛЯ ВИСИПУ



## УСКЛАДНЕННЯ

- ПНЕВМОНІЯ
- СЛІПОТА
- ЕНЦЕФАЛІТ
- ВУШНІ ІНФЕКЦІЇ
- ДІАРЕЯ ТА ЗНЕВОДНЕННЯ



## ЛІКУВАННЯ

ЯКЩО УСКЛАДНЕНЬ НЕМАЄ,  
ТРЕБА ПОБІЛЬШЕ ВІДПОЧИВАТИ,  
КОНТРОЛЮВАТИ ТЕМПЕРАТУРУ  
ТА ПИТИ БАГАТО ВОДИ

## ПРИЧИНА ІНФЕКЦІЇ

ЧЕРЕЗ КАШЕЛЬ  
І ЧХАННЯ,  
ТІСНИЙ ОСОБИСТИЙ  
КОНТАКТ



## СИМПТОМИ ХВОРОБИ

- НЕЖИТЬ
- КАШЕЛЬ
- ПОЧЕРВОНІННЯ ОЧЕЙ І СЛИЗОТЕЧА
- БІЛІ ПЛЯМИ НА ВНУТРІШНІЙ ПОВЕРХНІ ШКІ
- ЗНАЧНЕ ПІДВИЩЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
- ЧЕРЕЗ КІЛЬКА ДНІВ З'ЯВЛЯЄТЬСЯ ВИСИП - ВІД ВОЛОССЯ ДО ШИЇ, ПЕРЕДПЛІЧЧЯ, РУК І НІГ



## ПРОФІЛАКТИКА

ВАКЦИНАЦІЯ ПРОТИ КОРУ -  
ЦЕ НАЕФЕКТИВНІШИЙ  
СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ІМУНІТЕТУ ТА ЗАПОБІГАННЯ  
ЗАХВОРЮВАННЮ

